

# SAKAE GREEN NEWS

今月の特集：ヘクソカズラ・ヤブガラシ

平成30年5月号



株式会社 サカエグリーン

富山市野々上150番地 ISO9001/14001取得 TEL (076)434-0036 FAX (076)434-4968

## からみついたら離れない

ツタの絡んだ素敵なお屋敷には憧れますが、植え込みやフェンスなどに縦横無尽に伸びて絡まったつる植物を取り除くのは、結構な重労働です。今回は身近なつる性植物である、ヘクソカズラとヤブガラシをご紹介します。

ヘクソカズラはアカネ科の多年草で、別名ヤイトバナといいます。“やいと”とはお灸のことで、花の模様がお灸のあとに似ていることからきているようです。

“ヘクソ”カズラという名の通り、全体に強い臭気があります。茎は長いつるになっており、他物に巻き付いて伸びていきます。葉のわきから出た枝先が細かく分かれ、7~9月ごろ、そこに花をつけます。その後、光沢がある黄褐色の果実となります。




ヘクソカズラの花  
(8月)



ヘクソカズラに覆われたツツジの植込み(8月)

## ヤブガラシ(5月)



ヤブガラシは、ブドウ科の多年草です。やぶを覆い尽くして枯らしてしまうほど勢いがあることから、このような名前がついたようです。

ヤブガラシは、長い地下茎を横に伸ばし、その節々から発芽して増殖します。茎は急速に伸び、葉と対生して巻きひげを出しているいろいろなものに巻き付いたり、覆ったりしていきます。7~8月には房状に集まった小花をつけ、その後丸くて黒い果実をつけます。



ヘクソカズラやヤブガラシ、またクズといったつる性の植物は、生命力が旺盛で、すぐに広範囲に広がってしまう難防除雑草です。通常の除草剤散布で効果がみられない場合は、つるを切断し、切断面に除草剤の原液を塗布するとい

う方法もあります。その場合は、周辺に除草剤が付着・落下しないように十分注意してください。

## 製品紹介

### ハーレイDF水和剤

### 低薬量でスズメノカタビラ・メヒシバに優れた効果



- 有効成分：リムスルフロン 25.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：デュボン
- 包装：10g/袋、10袋入り/ケース

- 極めて低薬量で、発生後のスズメノカタビラやメヒシバに優れた効果を発揮する茎葉処理剤です。
- 気温や降雨による効果の変動もほとんどありません。
- スズメノカタビラに対しては、9-10月に使用した場合、効果の発現は早くなりますが、残効性は期待できません。11月以降に使用した場合は、効果の発現が緩慢になりますが、土壌中の分解が緩やかなため翌春にかけて長期の効果が得られます。

- メヒシバに対しては、春～夏期の発生揃期から2-3葉期までに使用してください。
- 使用の際は、展着剤(非イオン系)を加用してください。
- 西洋シバには使用しないでください。また、アルカリ性の肥料、農薬などの化学物質とは混用しないでください。
- リムスルフロンを含む農薬の総使用回数は3回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝	1年生雑草	春期～夏期 (雑草発生揃期～生育初期)	7.5～15g	150～200L
		秋期～冬期 (雑草発生揃期～生育初期)	5.0～7.5g	

### ザイトロンアミン液剤

### 広葉雑草を根から枯らす植物ホルモン型除草剤



- 有効成分：トリクロピル 44.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：ダウ
- 包装：1L/本、10本入り/ケース

- オーキシンの植物ホルモン作用により、植物の生長を攪乱し、体内の蓄積栄養分を消耗させ枯死させます。
- 茎葉処理により広範囲の広葉雑草を選択的に防除できます。
- 雑草生育期に葉が完全に展葉している状態で散布してください。
- 使用の際は必ず展着剤を添加してください。
- 西洋芝には使用しないでください。
- 夏期高温時や、芝の生育が劣っている場合は薬害を生じやすいので注意してください。
- 草花・植木等にかからないよう注意してください。
- 金属腐食性があるため、使用した器具や容器は十分に洗ってください。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10aまたは希釈倍数	希釈水量/10aまたは1株当たり散布液量
日本芝	1年生広葉雑草およびクローバー、チドメグサ等の多年生広葉雑草	雑草生育期	200～600ml	150～200L
林地	クズ	4～10月	25倍	10～20ml/株径3～5cm
		11～5月	3倍	1ml/株
		4～10月	2～3倍	0.5～2ml/樹径2～5cm

### ターザインプロDF

### 土壌処理と茎葉処理の両効果でしっかり防除



- 有効成分：イソキサベン 60.0%
- フロスラム 4.0%
- 毒性：普通物
- 魚毒性：A類
- 原体メーカー：ダウ
- 包装：100g/袋、20袋入り/ケース

- 一年生及び多年生広葉雑草、特にナデシコ科、キク科、マメ科雑草に高い効果を発揮します。
- 茎葉処理効果と土壌処理効果を併せ持つため、散布時期が広範囲です。
- 低温期に発生する雑草に高い効果があります。
- イネ科雑草に対しては効果がありません。また、生育の進んだ雑草には効果が劣ります。
- 使用の際は展着剤を可用して下さい。
- 遅効性のため、雑草が枯れるまで春夏期で2～3週間、秋冬期で4～6週間程度かかります。
- 付近の草花や花木、畑作物にかかったり、河川等に流入しないよう注意してください。
- イソキサベン及びフロスラムを含む農薬の総使用回数は2回以内です。

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量/10a	希釈水量/10a
日本芝 西洋芝 (ブルーグラス)	1年生及び多年性広葉雑草	芝生育期 (雑草発生初期)	30～50g	150～200L

取扱い・お問合せは—



緑を育み、未来へつなぐ

株式会社 サカイグリーン

〒930-0171 富山県富山市野々上150番地  
TEL:076-434-0036 FAX:076-434-4968