

### これからの森のために

皆さんは2024年度から徴収が始まる「森林環境税」をご存知ですか？私はつい先日まで知りませんでした。今回は、森林環境税について紹介します。

日本は国土の67%（約2,502万ヘクタール）が森林であり、森林率（各国の陸地面積に対する森林面積の比率）でいうと、世界で22番目に多く、先進国の中では高いと言えます。

森林には、国土の保全や水源維持、地球温暖化防止、生物多様性保全等の様々な機能があります。そうした公益的機能を維持していくためには、森林を適切に管理することが必要です。


日本の森林の約4割は人工林で、その内スギ・ヒノキ林が約7割を占めています。現在、その多くが当初予定していた伐採時期を迎えています。伐採されず放置されている林分が少なくありません。

かつては日本各地に林業によって栄えた街が存在した時代もありましたが、林業従事者は年々減少しており（右上図）、適切な森林管理が困難な状況となっています。このままでは、公益的機能が発揮できなくなるだけでなく、災害が誘発されることも考えられます。


このような背景から、森林整備に必要な財源を確保するために、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、2024年度から、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収するものです。また、自治体への配分（森林環境譲与税）は、特別会計を財源に2019年度から先行して始まっています（下図）。

#### ▼森林環境税と森林環境譲与税



#### ▼ 林業従事者数の推移



資料：総務省「国勢調査」 注：高齢化率とは、総数に占める65歳以上の割合  
若年者率とは、総数に占める35歳未満の割合

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。また、使い道についてはインターネット等を利用して公表する必要があります。

森林環境譲与税の配分基準は、私有の人工林面積、人口、林業就業者数を基にしており、都市部の森林がない自治体でも、人口が多ければ一定の金額が配分されます。そのため、使い道がない自治体もあるそうです。国のまとめによると、制度が始まった2019年度からの3年間で、全国の市町村に配分された約840億円の内47%にあたる395億円が活用されず、その多くは基金に積み立てられたということです。これには森林を多く有する自治体から不満の声があがっており、林野庁では本来の目的に合わせて、山間部への配分を手厚くするなど、配分基準の見直しを検討しているそうです。

また、整備の必要な山林を抱えている自治体でも、「専門の担当職員がおらず、国などから具体的な活用方法が示されていないためどのように使えばいいのかわからない」といった声があがっており、有効に利用されるには課題が多いようです。豊かな森林を次世代に残すため、有効な活用が望まれます。

## 製品紹介

### ダブルインパクト

### 地下部まで移行して全体を枯殺



茎葉処理

- 多年生雑草に効果の高いグリホサートと、スギナなどの広葉雑草に効果の高いMCPAのダブル効果で問題雑草を長期にわたって抑制します。
- 雑草茎葉部から吸収され、植物体内を移行、特に地下部まで移行して植物全体を枯殺するため、散布前に地上部を刈り払わないでください。
- 土壌中で速やかに不活性化するので、発生前処理では効果がありません。
- 使用に際して展着剤加用の必要はありません。

- 散布液剤の飛散により自動車やカラートタンの塗装などへ影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 水源地、養殖池などに本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。

■ 有効成分：グリホサートイソプロピルアミン塩 33.2%  
MCPAイソプロピルアミン塩 6.2%

■ 毒性：普通物  
■ 包装：5L/缶、2缶入り/ケース

| 作物名 | 適用場所                               | 適用雑草名      | 使用時期  | 薬量/10a | 希釈水量/10a |
|-----|------------------------------------|------------|-------|--------|----------|
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面、鉄道等 | 一年生及び多年生雑草 | 雑草生育期 | 1～2L   | 100L     |

### MCPP液剤

### 広葉雑草・スギナ・クローバーに卓効



茎葉処理

- クローバーなどの広葉雑草やスギナに優れた効果を示します。
- 浸透移行性があり、処理適期幅が広く使いやすい剤です。
- イネ科植物にはほとんど作用を示さないため、芝生に対して安全に使用できます。
- 低温時（10℃以下）の散布は効果が劣るので避けてください。

- キク科雑草には効果が劣るので、それらの優占する箇所での使用は避けてください。
- 芝が黄変する場合がありますが、自然に回復し、生育に影響はありません。

■ 有効成分：MCPPカリウム塩 50.0%  
■ 毒性：普通物  
■ 包装：500ml/本、20本入り/ケース  
5L/缶、4缶入り/ケース

| 作物名                     | 適用雑草名            | 使用時期  | 薬量/10a     | 希釈水量/10a |
|-------------------------|------------------|-------|------------|----------|
| 日本芝<br>西洋芝（ブルーグラス）      | クローバー<br>1年生広葉雑草 | 雑草生育期 | 500～1000ml | 100～200L |
| 公園、庭園、駐車場<br>道路、運動場、のり面 | スギナ              |       | 750～1000ml | 100～200L |

### ブロードスマッシュSC

### 低薬量で広葉雑草に優れた効果



茎葉処理

- 日本芝および西洋芝に対し高い安全性があります。
- 効果発現に高温を必要としないため、秋冬雑草に対して高い効果があります。
- 生育の進んだ雑草には効果が劣るため、雑草生育初期に使用してください。
- 遅効性のため、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- 使用の際は展着剤を加用してください。
- 草木、樹木の新芽などにかからないよう注意してください。

■ 有効成分：フロラスラム 4.5%  
■ 毒性：普通物  
■ 包装：250ml/本、12本入り/ケース

| 作物名             | 適用雑草名   | 使用時期          | 薬量/10a  | 希釈水量/10a |
|-----------------|---------|---------------|---------|----------|
| 日本芝             | 一年生広葉雑草 | 芝生育期（雑草生育初期）  | 20～40ml | 150～200L |
|                 | 多年生広葉雑草 | 秋期～冬期（雑草生育初期） | 40～80ml |          |
| 西洋芝<br>（ブルーグラス） | 一年生広葉雑草 | 芝生育期（雑草生育初期）  | 20～40ml |          |
|                 | 多年生広葉雑草 |               | 40～80ml |          |

取扱い・お問合せはー

緑を育み、未来へつなぐ

**株式会社 サカイグリーン**

〒930-0171 富山県富山市野々上150番地  
TEL:076-434-0036 FAX:076-434-4968