

パワーボンバー[®]

シャワータイプで効果持続



直接ボトルから散布するシャワータイプで、取扱いが容易な上、グリホサートの茎葉処理効果とプロマシルの土壌処理効果の相乗効果で早く効果が現れ、長期間雑草を抑えます。

一般名	グリホサートイソプロピルアミン塩・プロマシル液剤
登録番号	第22314号
有効成分	グリホサートイソプロピルアミン塩 2.0% プロマシル 0.40%
系 統	アミノ酸系 ダイアジン系
作用機作	EPSP(5-エノールビルビル-3-ホスホシキミ酸)合成酵素阻害 光合成(光化学系II)阻害
性 状	淡黄色透明水溶性液体
毒 性	普通物*
包 装	5ℓ×4
有効年限	5年

*毒劇物に該当しないものを指す通称

対象作物
適用場所

- 樹木等（公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等）


特 長

- シャワータイプでは初めての茎葉兼土壤処理剤です。
- 雑草を枯らして、後からの発生も抑えます。
- 2~14日で枯れ始め、根まで枯らすとともに雑草の発生も抑えます。
- さらに面倒な調合いらず。ボトルから直接散布できます。
- 雑草種子の発芽も抑え、3~4か月間雑草の発生を抑えます。

登録内容

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	プロマシルを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	20~40ml/m ²	2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	2回以内
				40~80ml/m ²		植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布兼全面土壤散布		
		ササ類		60~80ml/m ²				

※ 本表に作物名「樹木等」と記載していますが、本剤は直接樹木等に使用するものではありません。
本表の使用方法、注意事項に従って、樹木等に影響を与えないよう注意してください。



ササ



チガヤ



スギナ



セイタカアワダチソウ



効果・薬害等の注意

- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれがある場所等では使用しないでください。
- 本剤が植物の葉面や根から吸収されると薬害が発生するので、水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および樹木等有用植物の付近では使用しないでください。
- 傾斜地や砂質土壌では、本剤の流出による薬害の恐れがあるので使用しないでください。
- 本剤を散布した場所やその付近では、有用植物の植付けは行わないでください。
- ハウス等の施設内およびその周辺では使用しないでください。
- 本剤の飛散あるいは流出によって、樹木等の有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
- 水源池、飲料水、灌漑用井戸、養殖池等に本剤の飛散や流入及び浸透が想定される場所では散布を行わないでください。
- 本剤が流出するような激しい降雨が予想される場合は散布を行わないでください。
- 散布器具、容器はよく洗浄し、洗浄廃液は直接河川や用水路に流れ込まないように十分注意し、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 空袋、空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。



安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください(弱い刺激性)
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外
- が立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 魚毒性等:河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(藻類)
- 保管:密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、子供の手の届かない冷涼な所に保管してください。